

增廣大生要旨

增廣大生要旨序

言醫之書甚多而莫難於婦人科
婦人科醫書亦甚多而莫難於胎
產夫婦居室天地生人自然之理本
無所為難也特以人之賦稟有厚薄
強弱之不同血氣有虛實寒熱之各

異醫之者苟非因標達本竟委窮
源審其病之所在酌其藥之所主而
歸於的當鮮有不貽誤者大生要旨
一書為我邑唐桐園先生所纂著錄
板行世已久其中列種子胎前臨盆產
後四門酌選古方緊要皆切而穩簡而

明藥到回春以仰體天地大生之德
功莫大焉惜其版散失無存古婁葉
君雅卿仁心好善夙究岐黃其家世
藏婦科胎產諸方悉至精且當保命
衛生歷驗實有明徵者因即唐氏所
輯而增廣之至保嬰諸方俱選經驗

必效者而尤莫要於出痘故以稀痘種
痘為最穩種痘之方舊板亦失雅卿
尚須精選續刻以壽世先以此乞序於
余并附刻余所作種痘之序於後余
故不揣冒昧謹綴數言以推廣大生
之旨云爾

咸豐八年人日

海上翼雲江駕鵬謹識

松郡華署東
穆瑞釗刻印

增廣大生要旨序

大生要旨一書吾邑名宿唐桐園先生輯以壽世者也書凡五卷合婦科產科而一之使未生者保生將生者遂生已生者

全生體天地好生之心以生之不
窮生之不息誠哉其為大生也
是書板久漶漫近且失傳之所
輯但古方如新出休寧汪氏產科
心法脈藥各條闕而不備其他家

傳秘方無論矣雪間葉君雅卿
窮究刀圭六氣五味均有心得念
胎產一門母子命懸呼吸不容稍
緩頃臾也爰取原書參以心法
及秘方數則增廣成編錄以示余

余謂古來方書如孫思邈千金方
蘇沈良方樓稽而稽或格、不下
以故仲景稱醫聖所著方猶待
後人參酌而行之運用在心醫性
固不殊兵法也然獨玉保產保嬰

又不可不遵古法何則天地生萬物
物生而蒙穉而養皆亘古及今不
變之理無所矯揉造作於其間但
以體質不同感受偶異寒熱溫涼
隨方以補救之要在得乎中和位

育而止醫者苟師心自用庸術妄投
以性命為嘗試則固是書之罪人也
顧余又有誤焉生民詩曰誕彌厥月
先生如達夫物類之生其不忤不副
無害無害皆是也何獨於達比

之蓋羊性善又豕乳者也至於巢
窠之類雖未必皆胎生殯卵生強
碩生而無異不生則亦非天地所
樂得而生者也今以人主生也而曰
逆產則非順矣曰難產則非易矣

究其非順非易之故也亦有性成集
積而大異於達者與此又天下之生
者皆先慎之勿以器用方之不效而
自昧乎民之初生之本也是為序
咸豐八年歲次戊午重陽節之日

隳門李鍾翰

大生要旨一書爲世所珍久矣顧胎產各症間有未備方藥者令人不能無憾夫生育一事比戶有之順者固無煩醫藥設逢險逆刹那之頃兩命所係苟不速爲補救曷能母子兩全而窮鄉僻壤間延醫動至數里往返俄延鮮不敗事一爲設想不禁悚然爰集休甯汪樸齋先生名詒所著產科心法及家藏胎產各方附列大生要旨中名之曰增廣大生要旨付諸手民苟家置一編平時習閱則臨期可按症施治亦未始非生育之一助也猥以謏陋見聞未廣恐掛漏尙多倘

高明君子有以匡余不逮而賜教焉幸甚

咸豐八年歲在戊午孟夏

婁縣葉灝雅卿氏識

大生要旨原序

天地之大德曰生人者天地之心也自帝王卿相下逮一命之士編戶之民鈞是人卽鈞是心莫不以好生爲念而况人之始生兒命所關卽母命所係其所爲維持調護者更不可不周且詳也往者修善之家刊達生編保產機要等書世多有之而相沿襲刻未曉醫理其中不無舛誤且止及臨盆一節而於統前徹後凡得子之道育嬰之方則缺焉未備有心者每以爲憾同邑唐君桐園儒而醫者也其先封王父上采公精岐黃術以藥濟人行誼著通志孝義邑志獨行中尊人仁巖先生余之表母舅也明經碩望

增廣大生要旨 原序

秉鐸白門都人士翕然宗之居鄉居官咸能矜恤單寒至今猶感道不衰蹟亦具於邑乘君稟承世德學有淵源更師事邑之名醫王協中先生同遊講貫精通靈素百家今三折肱矣著有內經註疏傷寒論註疏脈燈諸書義博帙繁剗剗尙需歲月而彙輯大生要旨一編分種子胎前臨盆產後保嬰五卷參用舊說間出新裁視向來諸本務折衷於十全而無弊縉紳仁者見而寶之其勦付梓會予荷天子寵命巡撫黔中赴江蘇

行在所請

訓便假旋里得快讀斯編見其言簡而意該列明而義舉防於

未至拯於將危所附諸方一一斟酌精審在富室固可奉
行卽貧家亦可遵守至荒村僻壤急遽倉皇之際罔不可
檢閱以知保護因以歎是書之用心足補造化所不及而
爲功至鉅且遠也語云不爲良相卽爲良醫君真今之國
手乎播諸遐邇全活必多卽謂能體乾之大生坤之廣生
也可乾隆二十七年喬光烈潤齋氏序

產科心法自序

醫之一道爲司命之司原非容易但能存心濟人博考羣書臨症體察以人性命爲重雖未能有聖賢之學而虛實寒熱表裏陰陽辨釋明白用藥得當自不致於悞人而胎產一科尤宜謹慎守法略一錯悞則胎不保甚至產母亦傷能無怨乎至於產後總屬氣血空虛丹溪先生云雖有他症以末治之此誠千古格言白當遵前賢制方選用斷不可以杜撰悞人如無憂散佛手散生化湯之類千古不磨毋庸苟且每見今人醫產全不合法一味杜撰好奇名爲生化實非生化之意

時醫蓋以專誠請來僅以古方施治不特負此一請且恐爲人看輕

不得不搜索枯腸另開方體厚者僥倖得愈設遇體薄者藥而卒以害人深堪痛恨體厚者僥倖得愈設遇體薄者禍必立至至於產後汗出須防元陽外越泄瀉卽防中氣下脫喘急更防惡露上逆此皆產後極忌之處而產後發熱常有之也緣下元空虛陰虛生內熱只須四物湯加童便熱卽退也間有瘀血不行者有經風者有停滯者有蒸乳者各審其因而藥之風感者用歸芎補血之中加黑荊芥一味足矣蓋產時體虛百節開張腠理不固易入易出若表其汗則元陽外越未有不死者也其停滯者只於理脾之藥加穀芽陳皮可矣蓋脾虛則不運化宜用陽藥以助脾溫胃卽運化矣須知產後有邪總宜補中兼消未有

消而不補之理有等初學無傳之輩放胆竟用柴苓羌防
山查神麴之劑似治傷寒之病忘卻產後之身致輕者變
重重者卽死悞人不淺真可畏怕也況中風一症乃血虛
者多內經謂治風先治血血行風自滅張景岳先生師其
意發有非風之論此皆醫平人而言尙謹慎如此而況產
後肝血空虛虛生內風更可知矣夫天地有好生之德吾
儕可不慎重於斯而以人性命爲兒戲哉子每見而憫焉
因產科心法纂選成書此吾數十年來用之效驗悟於心
而應於手且簡而不繁俾產家觀之爲準繩則性命得以
安全醫家一有準繩則舉手無錯悞矣乾隆四十五年休

增廣養生要旨

原序

四

甯樸齋汪詰序

增廣大生要旨目錄

卷一

種子

論 種子方法 保胎論 女服加味地黃丸 正元

丹 坤厚資生丸 玉鑰啟榮丸 百子建中丸 神

效墨附丸 續嗣降生丹 男服還少丹 大補陰丸

千金種子丹 聚精丸 五子衍宗丸 延年益嗣

丹 寒谷春生丹

卷二

胎前

總論 驗胎 保胎 難產七因 胎前禁忌 胎前
節養六條 受胎保護 小產當慎 補母壽子安胎
飲

惡阻 二陳湯 六君子湯 竹茹湯

胎動不安 安胎飲 補中益氣湯 保胎丸

胎漏 膠艾湯 四物湯 防風黃芩丸 逍遙散

歸脾湯 八珍湯

子煩 犀角散 淡竹葉湯 香砂六君湯

子懸 紫蘇飲

子眩

子癰

又名子冒

四物加芩連姜夏湯

羚羊角散

理中

湯

子癰

又名子氣子滿

胎水

木通散

葵茯湯

白朮散

加味五皮飲

子嗽

又名子噎

宜胎飲

瀉白散

六味地黃湯

子瘡

子淋

冬葵子湯

子淋散

安樂散

葵子散

轉胞

三合湯

茯苓升麻湯

八味湯

滋腎丸

臍燥

又名厚悲

清燥湯

大棗湯

竹茹湯

尿血

續斷湯

膠地丸

乳泣

胎不長 異功散 黃芪湯 白朮丸

熱病防損胎 平胃散

妊娠傷寒 香蘇飲

瘧疾

泄瀉 神朮散

痢疾 葛芍湯 香連丸

鬼胎 雄黃丸 斬鬼丹

吐血 加味香蘇飲 加減清胃散

便血

孤漿

悞服傷胎藥

心痛 火龍散 手拈散

胸腹痛 當歸芍藥散

腰痛 青娥丸

子淋固真飲 安胎丸

綉閣保生保產方 大安胎飲 陳皮大半夏湯 抑

青丸 安胎和氣飲 養胎飲 大安胎如聖飲 清

胎萬全飲 束胎調氣飲 順胎和氣飲 滑胎飲

猪脂方

醫方考胎前要法 黃芩白朮考 砂仁薤湯 束胎

飲 達生散 安胃定胎散 保產無憂散 俗名十催

生諸藥說 痰鼓似胎案

瘦胎不可服辨 滋榮易產方

胎前十八方

卷三

臨盆

總論 六字真言 或問七條 十產論

血滯難產 臨產暈絕 交骨不開 胎死腹中 胞

衣不下 臨產宜忌

臨產方藥 紫酒 佛手散 臨產方 催生神柞飲

又方 八珍湯

難產醫案 加味益母丸 附胎產靈符

卷四

產後

新產宜忌

胞衣不下 失笑散 花蕊石散 牛膝散

血暈氣脫分別施治 清魂散 六君子湯

中風發瘧 愈風散 安神定志丸 歸脾湯 養心

湯

產門不閉 生化湯 八珍加味十全湯

心慌自汗 歸姜棗湯 醋炭薰法
惡露不下

血崩 補中益氣湯 瑞蓮散 參附湯

子宮不收 人參乾姜湯 敷藥方 寸金散 又四
方 不語 七珍散 又方 六味地黃湯

發熱 當歸補血湯

乍寒乍熱 愈風散

霍亂

浮腫

蒸乳

乳少 通脈湯 簡易方

乳癰

內吹
外吹

神效瓜蒌散

五物湯

簡易三方

香

附餅 逍遙散

狂言譫語

補心丸

定神湯

白金丸

琥珀地黃

丸 又方

心腹諸痛

二香散

理中湯

橘核丸

腹內癰

牡丹皮散

苡仁湯

排膿湯

陳皮葵根

湯 海浮湯

呃逆

橘皮竹茹湯

身痛

古拜散

腰痛 獨活寄生湯 清腰湯

蓐勞 白茯苓散 羊肉湯 人參鱉甲散

喘促

鼻中起黑煤 參蘇飲 貞元飲

舌黑舌枯 獨參湯

咳嗽

產後備方 增損四物湯 補脬飲 黃芪湯

產後奇病 四物湯

產後二十八症治法 倍參生化湯

五急症治法 十八危症治法 產科醫案

附安胎萬全神應湯

卷五

保嬰

總論 初生去毒 解毒開口法 開口方 先知百

勝散 生下不啼 斷臍裏臍法 臍風撮口論 清

熱順氣湯看臍帶 臍濕不乾 臍突光腫 浴兒法

藏胎衣

初生調護 小兒感冒 初生三急病 口噤 臍風 撮口 天

麻丸 定命丹 硃銀丸 又三方 辰砂膏 急救

臍風引

辨臍風 辨胎黃 附揉焦諸穴圖 又四方

遍體無皮 足趾向後 週身發泡 蝦蟆瘰 陰囊

縮腹 陰囊光腫 二便不通 不小便 乳輩馬牙

疳 驚口白屑 走馬疳 腮腫齙腫 重舌木舌弄

舌 口角流涎 兩腮腫硬 螳螂子 赤遊丹毒

夜啼 胎黃 胎驚 吐乳 變蒸 疳症 集聖丸

吃泥吃炭 吃生米吃茶葉 溺色 糞色 藥餌

宜慎

急慢驚風 急驚神方

慢驚 蕩驚湯 理中地黃湯 附子理中湯 溫中

補脾湯

四丹說

乾清散

坤靜散

交泰丹

神機丹

魃病

斷乳法

又方

稀痘

元兔丹

稀痘方

六味飲

夏秋冬三月稀

痘

附格言

耆齡培植

新增種痘說

增廣大生要旨卷一

上海唐千頃桐園氏纂著

婁縣葉 灝雅卿氏增訂

種子

總論

天地綱縉萬物化醇男女構精萬物化生此造化自然之理亦無思無爲之道也故有人道卽有夫婦有夫婦卽有子嗣人無不生育猶之山無不草木地無不黍稷然其要在得其養耳得其養則礮者以肥瘠者以沃草木黍稷何懼不蕃不秀乎人苟形質強壯而嗜欲無節久

之不免虛衰豈能宜子稟賦怯薄而攝養有道終焉亦
能完實何患難胎不特少健而老衰早壯而晚億滋培
保護之間固可以挽秋冬之凋殘而復春夏之花果也
昔名醫羅天益云戊午春桃李始花雨雪厚寸一圍叟
令舉家擊拊墮雪焚草於下是年他果蕭然而此園大
熟然則天地之氣尙可以力轉移於人之身豈無所用
其術哉

求嗣之要在乎男精女血充實而無病也故男以補腎爲
要女以調經爲先男子之不足則有精滑精清精冷者
及臨事不堅或流而不射或夢遺頻數或便濁淋瀝或

好女色以致陰虛或好僮倭以致陽極或過於強固勝
敗不治或素患陰疝肝腎乖離此外或以陽衰多寒或
以陰虛多熱若此者是皆男子之病不得盡諉之婦人
雖廣置姬妾徒自戕賊性命終無益也女子之不孕則
有經之或先或後者有一月兩至者有兩月一至者有
枯絕不通者有頻來不止者有先痛而後行者有先行
而後痛者有淡色黑色紫色者有瘀而爲條爲片者有
精血不充而作白帶白濁者有子宮虛冷而獨陰不成
者有血中伏熱而孤陽不生者有血痕氣痞子藏不收
月水不通者此皆女子之病不能育胎攝胎者也當各

因其病而治之然精血猶爲後天渣滓有形之物而一點先天眞一之靈氣萌於情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟眞篇所謂生身受氣初者是也故能滋腎調經之中而參行氣補氣之法更能養氣於平時然後一舉而孕天下之男無不父女無不母矣天地生物必有絪縕之時萬物化生必有樂育之候如猫犬至微將受妊也其雌必狂呼而奔跳以絪縕樂育之氣觸之而不能自止此天地之靈氣生化之眞機也世人種子有云三十時辰兩日半二十八九君須算此特言其大槩耳非的論也丹經云一月祇有一日一日止

有一時凡婦人一月行經一度必有一日細繲之候於一時辰間氣蒸而熱昏而悶有欲交接不可忍之狀此的候也於此時順而施之則成胎矣其曰溫溫鉛鼎光透簾幃言其景象也當慾情濃動之時子宮內有蓮花蕊者不拘經淨幾日自然挺生陰內如蓮蕊未開洗浴下體以手探之自知也但含羞不肯言耳求子丈夫預密告之令其自言一舉卽中矣

蓮蕊之說極効已屢經試驗矣

子嗣有無全在男子而世俗專主婦人此不盡然之論也易曰坤道其順乎承天而時行夫地之生物不過順承乎天則知母之生子亦不過順承乎父而已知母之順

承乎父則種子者果可以婦人爲主乎若以婦人爲主
試觀富貴之家侍妾已多其中豈無月水當期而無病
者乎有已經前夫頻頻生育而娶以圖易者顧亦不能
得胎更遣與他人轉盼生男矣豈不能受孕於此而能
受孕於彼乎所以謂子嗣主於男子不拘老少強弱不
拘康甯病患不拘精易泄難泄只須清心寡慾蓋以君
火在心心其君主相火在腎腎其根本也心不清靜則
火由慾動而自心挑腎先心而後腎者以陽燥陰是氣
從乎降而丹田失守已失元陽之本色慾若能寡則腎
足而陽從地起而由腎及心先腎而後心者以水濟火

是氣主乎升而百脈齊到期成化育之真機至有既孕而小產者有產而不育者有育而不壽者有壽而黃耆無疆者皆由男子心之動靜慾之多寡分爲修短耳世人不察以小產專責之母不育專付之兒壽夭專諉之數不亦謬乎其少年生子多有羸弱慾勤而精薄也老年生子反多強壯者慾少而精全也好飲者子多不育蓋酒性慄悍火毒亂精而濕熱勝也

大寒之後必有陽春天地之道不蟄封則不發育也今人之無子者往往勤於色慾豈知施泄無度陽精必薄縱慾適情真氣乃傷妄欲得子其能孕乎夫男象天主施

女象地主受一施一受其妊始成今其所施全非先天濃郁之氣不過後天澆漓渣滓之物縱使陰受可化而實無陽施之用矣故有心種子者母傷於思慮母耗其心神母意馳於外而內虛母志傷於內而外駁母以酒爲色媒母以藥物助火燥精彙神靜養日久及至陰陽交媾兩神相搏其一點先天元真之氣勃勃生育之機卽寓於慾情大動之時萬舉而萬當矣內經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃絕老子曰必清必靜毋搖爾精人鏡經曰精氣盛則生二男諺云寡慾多男子歷歷名言不特老而無子者當奉爲龜鑑卽壯年難子

者亦須尊爲節符

天地之道祇貴和平太熱則陽亢太寒則陰凝陰凝肅殺人果知之陽亢消爍人都不察常見世之艱於子嗣者構覓傳方希圖種子偶見一人用之而中竟不論己之宜否而偏聽如神競相製服將宜於彼者竟謂亦宜於此矣况所編傳種子之方大抵興陽壯熱之品居多甚至煅煉金石及製取毒穢悍劣諸物炫詭矜奇但助房中之樂不顧喪身之禍深爲可愍可恨豈知種子之方本無定軌因人而藥各有其宜凡寒者溫之卽種子也熱者涼之卽種子也滑者澀之虛者補之去其所偏使

陰陽和平而生化皆種子之法也

種子求嗣之說自古迄今言之不少其以訛傳訛近於春
方採煉者姑置弗論卽如道藏經以月信止後單日屬
陽成男偶日屬陰成女廣嗣訣以經期方止子宮正開
及時布種褚氏遺書以血裏精成男精裏血成女東垣
以經斷一二日感者成男四五日感者成女丹溪以受
氣於左子宮爲男受氣於右子宮爲女聖濟經以左動
成男右動成女諸說紛紛或有近理或有憑虛未免穿
鑿予以一言蔽之曰寡慾則有子蓋寡慾則不妄交合
積氣儲精待時而動亦何求而不得歟然寡慾必先清

心心主血而藏神心有所動神即外馳腎志亦隨之而
內亂歐陽永叔所謂有動乎中必搖其精也輕則夢洩
白淫重則成癰發毒即幸而免其於交會之際毫無靜
一清真之氣所洩之物腐濁而已安能發育長養於其
間哉心爲一身之主苟能掃盡邪思自然慾寡神完不

惟多子抑亦多壽養心莫善於寡慾正所謂也

一說婦人單歲

雙月受胎雙歲單月受胎必生男子其說頗效合之前篇運虛之說謹守寡慾之戒加以廣積陰功弄璋之慶可操券而得也

飲食之類雖人之臟氣各有所宜似不必過於拘執惟酒
多者最爲不宜蓋胎元先天之氣極宜清楚極宜充實

而酒性淫熱非惟亂性亦且亂精精爲酒亂則濕熱其半眞精其半耳精不充實則胎元不固精多濕熱則他日胎毒瘡瘍痘疹驚風脾敗之類率已造端於混沌之初矣故凡求子者必宜先有所慎與其多飲不如少飲少飲不如不飲內遠七情外薄五味大冷大熱辛辣膩滯有毒等物一一戒謹此亦胎元之一大機也

求子交會古有擇吉日良時天德月德及四時旺相避忌丙丁幼幼新書著御女日期諸說似屬迂遠不足憑也然惟天日清明光風霽月時和氣爽之宵自己清思清和精神閒裕不待擇而得天時之正避日月電光之下

神社井竈之側冢柩穢汚之處又得地利之靈兼之以
前所云清心寡慾之人和則得子定然賢智無病而壽
初交之後最宜將息弗復交接致擾其子宮盜泄母陰奪
養胎之氣蓋淫火一動則搖撼督脈胞門亦由之而不
閉胎始墮矣惟有一月之墮胎則人皆不知有胎但知
不受妊不知其受而墮也此名暗產弗謂我強何虞無
子弗謂年壯縱亦不妨一次旣墮則肝脈受傷他次亦
墮自一而再自再而三隨得隨失猶然莫知今之無子
者大半是一月墮胎非盡不受妊也牝獸無墮胎之患
以牝牡交合有節懷胎之後牝獸不能近身是以交而

必孕孕而必育最善護胎設懷妊而不遠慾卽幸不墮生子必脆弱多疾痘疹亦必險逆慎之慎之

附採男女種子中正和平王道數方以便深山窮谷僻壤無醫者

加味地黃丸 婦人經事不調卽非受孕之兆縱使受之亦不全美此丸主之男子陰虛內熱者亦宜服此

熟地

肆兩

山萸肉

山藥

各貳兩

丹皮

白茯苓

各壹兩半

澤瀉

香附

童便浸叁次炒各壹兩

蘼艾

云筋醋炙伍錢另服去附艾

右爲末蜜丸桐子大每服七十丸白滾湯送下

正元丹

調經種子

香附壹觔同蘇艾參兩先以醋同浸壹宿然後阿膠粉

炒貳枳殼肆兩壹牛生生地酒洗熟地當歸洗川芎

炒各白芍捌兩半加白茯苓琥珀治帶

右爲末醋糊丸如桐子大每早空心鹽湯下六十丸

坤厚資生丸 治經事不調臨期腹痛不能受孕

九製熟地當歸酒蒸各白芍酒炒川芎酒蒸壹丹參

酒蒸參兩羌蔚子酒蒸香附肆兩醋酒薑汁白朮肆兩陳

右爲末以益母草八兩酒水各半熬膏和煉蜜爲丸

每早開水下四錢 如月經先期而至脈數屬血熱

加生地丹皮 後期而至脈遲屬血寒加肉桂 將

行而腹痛是氣滯加烏藥木香 食少氣虛面色眊
白四肢無力是氣血兩虧方中減香附一半加人參
黃耆茯神棗仁遠志之類

玉鑰啟榮丸 治女子一無他疾經事調勻容顏不損但
久不胎孕

人參 白朮 甘草 茯苓 當歸 川芎 白芍

熟地

沒藥

去淨油

藁本

丹皮

赤石脂

延胡索

白芷

白薇

以上各貳兩除石脂末藥另研外其餘用醇酒浸三日焙曬乾

香附

去毛水醋

浸三日炒乾爲細末壹拾伍兩

右共爲細末煉蜜爲丸空心溫酒下五十丸如不飲

酒白開水服亦可服後即乾物壓之

百子建中丸 調經養血月事參差服之期年即能孕子

熟地 阿膠 蛤粉炒 蘼艾 去筋梗 川芎 去蘆 當歸 去尾 白芍

酒炒各 香附 剉兩去毛并碎水醋

右為細末煉蜜丸桐子大每服八十九丸空心以醋少

許點湯下內寒者溫酒下

神效墨附丸 治婦人久不孕經事不調及數墮胎者

香附 拾貳兩去毛并成米粒分作肆分米泔酒 蘼艾 兩

去筋梗用酒二碗同香附一處煮乾石臼內杵 白茯苓

爛趁如錢厚大餅子新瓦上炭火焙燥搗磨 人參 去蘆 當歸身 酒浸 川芎 熟地 上微墨 煨醋淬 各壹兩

廣木香錢伍

右爲末醋和爲丸桐子大每服五十丸空心好酒下

續嗣降生丹 治婦人五臟虛損子宮冷憊不能成孕

當歸 杜仲酒炒 茯神 益智仁 龍骨煨 桂心 吳茱

萸製 乾姜半生半熟 川椒去目 烏藥各壹兩 白芍酒炒 川牛膝酒浸半

夏製 防風 秦艽 石菖蒲 北細辛 桔梗各伍錢 附

子一枚重一兩者 廣下作一竅入朱砂參牡蠣 以童便

浸錢麵裏煨熟取出 朱砂雷爲衣去附子 硫黃壹兩爲末酒和

塗四十九日每五日一換取出 用鹽泥厚固之候乾用

炭五觔煨過爲末每料止 用貳兩餘可收貯再用
右爲末以酒煮糯米糊爲丸桐子大用前朱砂爲衣

每服五十丸漸增至九十丸空心開水或鹽湯溫下

還少丹 治男子命門火衰陽事痿弱精氣不足陽虛症

山藥

牛膝

酒浸

遠志肉

山萸肉

去核

巴戟

去心

白茯苓

五味

石菖蒲

肉蓯蓉

楮實

杜仲

炒

茴香

各一兩

熟地

壹兩伍錢

枸杞子

壹兩伍錢

右爲末煉蜜和棗泥丸每服五十丸溫酒或鹽湯下

日三服食前服

大補陰丸

治男子相火熾盛內熱遺精尿血

黃柏

鹽酒炒

知母

鹽酒炒

熟地

龜板

去旁酥炙各陸兩

右爲末煉蜜和猪脊髓丸桐子大每服七十丸空心

鹽湯下

千金種子丹

治精滑無子及虛損夢遺白濁

沙苑蒺藜

取淨末肆兩再以重羅篩極細末貳兩入藥粗末貳兩用水壹大碗熬膏聽用蓮鬚

揀金色者四兩紅
色敗精不可用

山萸肉

叁兩焙乾

覆盆子

貳兩芡實

肆兩龍骨

五色者佳伍錢
火煅紅水飛用

右爲末煉蜜止用四兩同蒺藜膏和爲丸空心鹽湯

下
叁錢

聚精丸 治精薄無子

黃魚鰔膠

切蛤粉炒成珠壹觔沙蒺藜 捌兩馬乳浸兩宿隔湯蒸一炷香取起焙乾

右爲末蜜丸每服八十九丸空心溫酒下忌食魚及牛

肉若氣虛而精不遠射者以蜜炙黃芪四兩煎膏和

煉蜜搗丸

五子衍宗丸 此藥添精補髓通利腎氣不問下焦虛實

寒熱服之自能平秘乃古今第一種子方也

枸杞子

兔絲子

酒煮
搗兩

五味子

壹兩

覆盆子

肆兩酒
洗去蒂

車前

子

貳兩
炒

右爲末煉蜜丸空心服九十九丸臨臥五十丸鹽湯開

水任下冬月溫酒下

延年益嗣丹

生地

熟地

各叁兩

地骨皮

伍兩酒洗

人參

叁兩

天冬

去心酒洗叁兩

麥

冬

去心酒洗叁兩

白茯苓

酒潤伍兩

何首烏

牛筋竹刀刮去皮切片置砂鍋內下用烏羊肉

壹觔馬料豆三合量著水上加筴放首烏於筴上復覆蓋蒸一二時候冷取出曬

右共爲末煉蜜爲丸每晨服五十九丸溫酒下

寒谷春生丹 治虛寒年邁陽痿精衰無子

熟地

兩捌冬朮

當歸

枸杞

各陸兩

杜仲

酒炒仙茅

酒蒸一日巴

戟肉

甘草湯泡

山萸肉

淫羊藿

羊脂拌炒

韭子

炒黃肉蓯蓉

酒洗去甲

各肆兩

蛇床子

微炒

製附子

肉桂

各貳兩

右爲末煉蜜丸淡鹽湯或溫酒下七十九丸或加人參

鹿茸更妙

增廣大生要旨卷二

上海唐千頃桐園氏纂著

婁縣葉 灝雅卿氏增訂

胎前

總論

婦人胎產造化自然之理時至則生不必驚疑而人人不免驚疑者爲未明乎自然之理也呂祖云天生天養不必着忙造化原不令人小產人多不守禁忌因而小產造化原不令人難產人多不善調攝因而難產造化原不令人逆生人多倉皇無主因而逆生小產及難產逆

生性命攸關可不慎歟至於穩婆臨產時不可不用斷
不可輕易聽從蓋此輩無書傳授偏執已見胡做亂爲
往往誤事婦人如不識字爲夫者宜於平日將此書常
爲講解令婦熟聞懷孕知調攝臨產有主張并誠穩婆
安靜以待之自無小產難逆之患凡婦人受妊之後常
令樂意忘憂運動氣血安養胎元早當絕去嗜慾節調
飲食內遠七情外避六淫心宜靜而不宜躁體宜動而
不宜逸味宜平而不宜熱食宜煖而不宜寒母久立母
久坐母久臥又宜卻去一切肥甘煎炙油膩辛辣鹹酸
水果魚鱉狐兔鴿雀之類卽無胎漏胎動下血子墮子

痼等症及橫生逆產胎死腹中之患降生之後又無胎
熱胎寒胎肥胎怯胎驚胎黃諸般胎毒先正胎教宜遵
行之

婦人經期不來已過四五十日或偶見紅而少或脈不應
指疑似之間驗之用川芎爲細末煎艾水調空心服二
錢腹內覺微動則是孕不動者非也或以外象參看如
見食不喜食或惡心而吐或體倦欲臥雖體質平常孕
脈不現只要六脈調和亦當是孕此卽是人病脈不病
但與養血安胎之藥數劑孕脈自現矣

保胎

婦人懷孕卽遷別室另寢常使身心清靜不犯房勞夜睡須左右轉換使小兒左舒右展肢體活動臨產自然快便生子亦必聰明少疾

贊育編難產七因

一因安逸婦人懷胎血以養之氣以護之宜時常行動令氣血周流胞胎舒展若久坐久臥氣血凝滯則必難產常見田家勞苦之婦其產甚易可證也

一因奉養胎之肥瘦氣通於母恣食厚味多致胎肥難產常見貧家婦容易生產可證也故產母調攝須以白飯香蔬略用肉食爲妙

一因淫慾古者婦人有孕卽居側室不共夫寢若有孕而犯之三月以前常致胎動小產三月以後一則胞衣太厚而難產二則子身有白濁而不壽三則子多瘡毒出痘細密難起以致死亡皆由父母慾火所結耳

一因憂疑今人不講生產之理或問禍福於鬼神或用禱求於卜筮或里中有產厄者孕婦聞之則懼懼則氣怯故亦難產

一因嬌怯如少婦初產子戶未開卽便腰曲不伸展轉傾側以致兒不得出又中年婦人生育旣多氣血虛損產亦艱難須胎前服補氣養血之藥調理康健則臨產無

虞婦人稟體素弱者亦同此例

一因倉皇將產之際有等愚蠢穩婆不審正產與轉胎但見腹痛遽令努力催生產婦聽從以致橫生倒生子母俱傷

因乏力臨產用力太早及見欲出母力已乏停住艱難須服人參湯接力卽產

胎前禁忌

一忌食有毒傷胎諸物

牛 犬 羊 驢 馬 兔 鱔 鯊 蟹 黑魚

鱗魚 無鱗魚 雞肉 雞子 鴨子 雀肉 田鴿

豬頭 豬腳 豬心 豬腦 蔥 肝腸 血

胡椒 子薑 茨蔬 香菌 苡仁 蒜 梅子

杏子 地栗 茄子 萵苣 冰漿 漿水粥 生冷

油麪等物 豈醬不可與藿同食 附忌服藥品歌

烏頭附子與天雄 牛黃巴豆並桃仁 芒硝大黃

牡丹桂 牛膝藜蘆茅茜根 槐角紅花及皂角 三

稜莪朮薏苡仁 乾漆藺茹瞿麥穗 半夏南星通草

同 乾姜大蒜馬刀豆 延胡常山麝莫聞 黑丑枳

榔同蘇木 傷胎之藥避其凶 此中有安胎止嘔不

得不用半夏者必用開水泡洗三次以去燥烈之性嘔

止卽去有熱病閉結傷寒傳經入腑而必欲大黃者有中寒於陰必欲姜桂者此卽有病則病當之乃從權也然必不得已而用之不可過劑而藥中亦必有顧胎之味總之胎前有病重在保胎產後有病重在溫補此至穩至當之理

一忌洗浴凡覺受妊不可洗頭不可洗足不可浴身多洗下體則竅開胎易墮初受胎及臨月尤宜禁戒關係非小

飲食宜淡泊不宜濃厚宜清虛不宜重濁宜和平不宜寒熱但富貴之家肥甘悅口抑令崇儉勢必不能酌其所

宜開後

蓮心 松子 熟藕 山藥 芡實 鯽魚 鴨

鱸魚 海參 猪脂猪腰肺 麻油 淡菜 腐衣

笋

弗多飲酒弗亂服藥

一切宰殺兇惡之事不宜看脩造立木不宜看龜兔怪異
諸物俱不可見

胎前節養六條

每見產後絕症隨產隨脫無計可施有一種氣虛欲脫瘀
血猶滯於中汗出神昏上吐下瀉或面青肢冷或氣喘

直視危急異常因於瘀滯者用生化湯或芎歸湯先通其瘀卽補其原有一種產時去血驟多因而虛脫者用獨參湯沖童便服或參附湯先保其原再和其血又有一種元氣又真虛瘀血又壅滯欲補其原瘀卽上攻欲消其瘀原卽隨脫雖有攻補兼施之法如人參蘇木飲人參生化湯之類亦難見效此名絕症祇因胎前失於檢點及至臨盆欲救不能追悔何及謹列胎前節養六條預爲調理指引孕婦皆登壽域

一除惱怒凡受胎後切不可打罵人蓋氣調則胎安氣逆則胎病惱怒則否塞不順肝氣上沖則嘔吐衄血脾肺

受傷肝氣下注則血崩帶下滑胎小產欲生好子者必須先養其氣氣得其養則生子性情和順有孝友之心無乖戾之習所謂和氣致祥無不由胎教得之也

二禁房勞保產以絕慾爲第一要事試觀猫犬至微尙知有孕後不復交合何況人爲萬物之靈而反不如之耶所以婦人於懷孕後必須分牀獨宿清心靜養則臨盆易生易育得子少病而多壽倘房勞不慎必致陰虛火旺半產滑胎其害有不可勝言者可不謹歟

三戒生冷胎前喜食生冷只因懷孕以後多惱多氣不慎房勞以致火旺口渴殊不知生冷等物豈能退血分之

熱徒使脾胃受傷瘧疾痢疾嘔吐泄瀉諸病皆由此起
病則消耗精液口渴愈甚惟戒惱怒慎房勞服健脾補
血之藥調理本原可保平復否則臨產之虛脫產後之
絕症斷不免也

四慎寒溫胎前感冒外邪或染傷寒時症鬱熱不解往往
小產墮胎攸關性命要知起居飲食最宜調和夏不登
樓宜著地氣夜不露坐宜煖背腹古人有言不受寒自
不發熱不傷風自不咳嗽此爲胎前緊要關頭

五服藥餌胎前產後藥能起死回生世人監誤治之害遂
言胎產不必服藥迷亂人意以致失於調補株守含忍

勉強臨盆諸症蜂起若知節養有方隨時調治其所安
全母子者藥餌之功正復不淺也

六宜靜養胎前靜養乃第一妙法不校是非則氣不傷矣
不爭得失則神不勞矣心無嫉妬則血自充矣情無淫
蕩則精自足矣安閒清靜卽是胎教紹宗祧之重承以
姑之歡叶琴瑟之和衍螽斯之慶者胥在是也

受胎保護

一受胎後不可看戲及鬼怪形像

一受胎後不可升高處恐傾跌有損亦不可舉手向高處
取物恐傷胎而子鳴腹中如鐘聲亦有治法但令曲身

片時卽安蓋胎內有疙瘩兒含口中因母舉手向高處
脫出兒口是以啼也又法散錢於地令母拾取亦效

一受胎後三五箇月常要緊束其腹勿令胎放難產

一受胎六七箇月或八九箇月胎忽亂動兩三日閒或痛
或止或有水下但腰不甚痛是胎未離經名曰弄胎又
曰試胎胎水有無俱不妨但直身坐臥行立不可驚憂
逼迫以致悞事二者俱非正產必因觸犯至此

小產當慎

三月五月而墮者爲小產此因胎臟損傷胞繫腐爛以致
墮胎此比正產更險視爲輕忽而殞命者極多必須倍

加將息宜服補血養氣生新去瘀之劑世更有服墮胎藥者爲禍最烈也

七月而墮者爲半產此除跌蹠損傷外有無故而忽墮者多在三五七月若前此受胎此月曾墮者後至此月必應期而墮

娠妊三月乃手厥陰心包絡所養心包絡名相火內屬於心代君火行事其經多血少氣若悲哀思慮驚動而神氣內虛則墮當此之月名曰始胎血不流行未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好玩佩玉欲子賢能講論詩書欲子端正莊嚴口談正

言身行正事是謂外象而內感者也

娠妊五月乃足太陰脾經所養脾爲五臟之本生化之源其經多氣少血若飲食失宜起居不慎脾土受傷不能化血養胎則墮

妊娠七月乃手太陰肺經所養肺主一身之氣所以流行血氣舉載胎元是經亦多氣少血若多言大哭薄衣洗浴食涼犯寒氣血虧損不能內固則墮○凡此三經關係最大此月經虛不能任養而墮後至此月經益虛故復墮必須用對症之藥先期半月服十餘劑調補防過此月則胎可固矣

大凡胎氣腹痛者常事而腰痛則切須防備急宜服藥補
腎安胎不可不早至紅一漏只可十保其三宜服之胎
飲重用熟地或加人參桑寄生但小產重於大產蓋大
產乃瓜熟蒂落天生自然小產必有所由驚動而下乃
斷其蒂胎之胞附於帶脈帶又環繫於腰是以腰痛帶
脫胞胎卽下矣預服保胎丸卽無患方見後又法三月前
用芎歸補中湯或茯苓湯五月前用安中湯或五味異
功散加芎歸麥冬阿膠如嘔吐用六君子加砂仁山藥
扁荳生姜大棗七月前用補中益氣湯倍加當歸川芎
砂仁棗仁薑棗如有別症更加斟酌此月防過尤宜加

慎

補母壽子安胎飲養血益胎治屢產生子無氣或育不壽氣血

虛弱孕成不安或得孕數墮照方每月限五帖弱甚者
十帖大益胎而分娩易又生子精神而有壽神效良方
也

人參壹錢弱人白朮貳錢歸身貳錢川芎捌分懷生地蒸熟條

芩壹錢紫蘇貳錢陳皮各肆分甘草各肆分虛肥人陳皮去白加黃

連五分棗二枚水煎

脾胃弱常泄瀉加蓮子拾粒帶皮砂仁叁分減地黃

多怒而瀉再加木香貳分 口燥加麥冬壹錢 怔忡去心

驚悸加棗仁益智仁

各壹錢

桂圓拾枚

惡阻

孕婦嘔吐名曰惡阻非指經阻而言

娠妊之際經不行濁氣凝滯上干清道或中脘停痰胸膈
滿悶眩暈嘔吐或倦臥無力而不喜食或一時覺大病
之象過時而全無病此所謂孕婦多怪病實非病也名
惡阻方用二陳湯加枳殼炒砂仁去殼研各肆分以安胃化痰
若脾氣虛用六君子湯加紫蘇梗 枳殼炒砂仁炒各伍分
香附陸分加姜棗煎服其半夏必用姜水泡洗三次若與
人參同用更穩惡阻之症雖屬尋常然嘔多不食氣必
上逆逆則防冲動心包孕婦有礙急宜安胎調胃

二陳湯

製半夏壹錢 廣陳皮柒分 白茯苓壹錢 炙甘草伍分

本方加人參捌分 白朮壹錢 即六君子湯俱宜加姜棗煎服

竹茹湯 治懷孕五十日四肢軟倦背惡寒眩暈惡心嘔

吐痰涎思食酸物為惡阻之症宜服此湯五六劑

熟半夏泡 陳皮 蘇梗 廣藿 條芩焙 枳殼麩炒

白芍酒炒各壹錢 雲苓壹錢伍分 竹茹叁分

河水煎如火旺吐甚者加酒炒川連伍分黑山梔壹錢

麥冬貳錢去心胃虛者加白朮壹錢土炒金石斛貳錢

氣滯者加香附壹錢酒炒

胎動不安

胎動各有所因或怒動肝火或起居不慎或跌撲閃動及房事動擾則胎不安孕婦腰痛發熱不食不眠方用安胎飲主之各有加減若不安之甚防其胎傷於內須驗其舌色面色如面赤舌青知胎已傷面青舌赤母傷子存面舌俱赤母子無妨面舌俱青母子亡如口吐白沫唇口色青者立死不救故娠妊者切宜慎養

安胎飲

大熟地

叁錢

歸身

壹錢

白芍

酒炒 壹錢

炙草

伍分

艾葉

伍分

砂仁

伍分

研分

白茯苓

壹錢 伍分

川芎

叁分

白朮

土炒 壹錢

阿膠

壹錢

水煎服

起居不慎房事擾動者加人參壹錢杜仲貳錢川斷壹錢桑寄

生貳錢如無力用參以蜜炙黃芪三錢代再加潞黨參貳元

炒貳錢

若怒動肝火本方加柴胡叁分黑山梔捌分若脾虛氣滯

除熟地加人參伍分陳皮伍分白扁豆貳錢若跌撲傷動

另用當歸壹錢伍分川芎伍分青木香壹錢桑寄生二三錢此物

真恐不若感風寒相搏須按各經以祛之輕者於本方

除熟地加蘇梗壹錢此物能寬胎或加青芎叁錢大凡

皆可加入更有氣虛胎下陷者另用補中益氣湯以升舉

胎元則安凡體弱之人安胎飲內皆宜加人參即合成

膠艾八珍湯

補中益氣湯

炙黃芪貳錢 白朮土炒壹錢 陳皮伍分 歸身壹錢 柴胡蜜炙叁分 升麻蜜炙

叁分 炙甘草伍分 加姜棗煎服

保胎丸 亦名千金保孕方極有效驗

杜仲剉兩用糯米粥湯拌蒸曬乾炒 山藥炒陸兩另磨粉 川斷鹽水炒肆兩

當歸酒炒貳兩

用山藥粉打糊加棗肉爲丸不拘時開水下四錢凡有孕者卽合服之服過七箇足月方止此方物省而功大永無小產之患且產後多乳貧家宜傳此方與服雖受

外感亦勿間斷見有小產者卽傳此方其效如神

凡孕婦患虛損潮熱骨蒸少力或崩漏或少食皆由氣血不充胎弱不能鼓動或胎不安上攻或跌撲損胎不動或患熱病損胎或悞服動胎藥及食莧菜雖血行胎逼斷不可用落胎之方妄議去胎以救母必須滋補母之氣血力健自安卽果胎死助血自落若強攻其胎胎落而母卽殞矣慎之慎之

胎漏

婦人之經血一有孕時卽畜之以養胎至產後則變乳以養子此天地生人自然之妙倘孕婦忽然見紅名曰胎

漏急宜服藥勿使血去多而胎不保也

膠艾湯 懷孕而點滴下血者係陰虛不足以濟火氣虛

不足以固血也此湯主之

熟地

壹錢

艾葉

伍分

當歸

壹錢

川芎

伍分

甘草

伍分

黃芪

貳分

黃芩

伍分

阿膠

蛤粉炒

五分

產科心法曰若因風熱動血者用四物湯送防風黃芩丸

二錢一日二三服若因怒動肝火者用逍遙散加黑山

梔

壹錢

條芩

伍分

若血虛妄走者用四物湯加茯神

貳錢

阿

膠

壹錢

艾葉

伍分

蓮子

拾粒

若脾虛不能攝血者用歸脾湯

加膠艾蓮子

若氣虛下陷者亦用補中益氣湯若去

血太多須用八珍湯大補之必要人參卽同血脫益氣一體耳百問曰胎息未實勞力觸犯或食毒物或房勞驚恐令子宮虛滑經血淋瀝敗血湊心子母難保此急症也速大補之產集曰肝經有風下淋胎血宜服防風黃芩丸此實症也

四物湯

大生地參錢 當歸壹錢 白芍壹錢 川芎參分 加絲絲燒灰伍分

水煎服

防風黃芩丸

實條芩醋炒黑壹兩 防風壹兩 共爲末酒糊爲丸米湯下

逍遙散

歸身壹錢 白芍壹錢 白朮壹錢 柴胡叁分 炙甘草伍分 茯苓壹錢

水煎服

歸脾湯

人參壹錢 白朮壹錢 黃芪貳錢 歸身壹錢 炙草伍分 茯苓壹錢 遠志伍分 廣木香伍分 桂圓肉伍分 加姜棗水煎

煎

八珍湯

人參貳錢 白朮叁錢 茯苓貳錢 甘草伍分 熟地伍錢 歸身壹錢 白芍壹錢

錢川芎伍分 加姜棗煎服

補中益氣湯

見前胎動

千金方曰娠妊下血不止名曰漏胞胞乾便死急用生地
八兩以清酒三升煮減半絞去滓服此亦急症也
有等妊婦紅漏不多精神如故六脈和平此小兒血盛有
餘之症也

子煩

犀角散 懷妊而煩悶者心肺有熱也名曰子煩此方主
之

犀角

伍分

地骨皮

貳錢

麥冬

貳錢去心

赤茯苓

壹錢伍分

條芩

壹錢

草

伍分

產科心法曰子煩症心煩悶亂說不出之難過此君相二
火翕聚以養胎火盛內熱致煩也宜用淡竹葉湯主之
若氣滯痰凝而悶者用二陳湯加白朮黃芩蘇梗枳殼
若脾虛胃弱食少嘔吐者用六君子湯或加香砂以安
之但子煩之症不善調攝則胎動不安須防小產之患
又有吐久氣逆胃元大虛不能進食恐致產母氣脫故
初卽欲降火繼卽安胃進食此一定之理也

淡竹葉湯

淡竹葉拾片洗黃芩壹錢知母壹錢麥冬壹錢五分茯苓貳錢水煎

服

二陳湯

見前惡阻

六君子湯

同見前

如加香附

捌分

砂仁

伍分

卽香砂六君子湯

子懸

紫蘇飲

懷孕而胎氣不和湊上心腹腹滿閉悶氣塞欲

死名曰子懸此方主之

蘇梗

壹錢

人參

壹錢

陳皮

壹錢去白

當歸

貳錢

川芎

捌分

大腹皮

貳錢豆汁

浸水洗

甘草

伍分

白芍

壹錢伍分酒炒

子眩

產科心法曰子眩爲氣逆暈厥並用紫蘇飲然有脾虛夾痰用六君子湯加天麻五分若脾不甚虛獨頑痰閉塞

者用二陳湯加竹瀝姜汁虛實之間宜察辨之如不合
法卽防胎落大約肝經氣逆者多予常用紫蘇飲加枳
殼鈎藤而安

紫蘇飲

見前

六君子湯

二陳湯

並見前
惡阻

子癇

又曰
子冒

四物加芩連姜夏湯

懷孕而癇仆者由陰虛火亢痰氣

厥逆故令暈倒作羊犬之聲名曰子癇此方主之

當歸

貳錢

川芎

陸分

熟地

叁錢

白芍

酒炒

黃芩

酒炒

各貳錢伍分

黃連

酒炒

伍分

半夏

製泡

生薑

貳片

產科心法曰孕婦血虛風邪入肝忽然昏冒不知須臾卽

醒過時復發久則變痙痙卽口噤搐搦背腰反張如兒童發驚之狀方用羚羊散定之若怒動肝火佐以逍遙散加人參五分若引動胎氣逆上佐以紫蘇飲兼脾虛夾痰者佐以六君子湯或因中地而發者宜用理中湯加防風鈎藤此症宜速治若頻發無休不但胎孕驟下抑或血隨渙散母命難保如胎下卽大溫補氣血爲要方可保全母命遲恐難以挽回

羚羊角散

羚羊角

獨活

各壹錢

當歸

貳錢

川芎

叁分

人參

捌分

茯神

壹錢

伍分

桑寄生

貳錢

鈎藤

叁錢

防風

柒分

甘草

伍分

加姜煎服

或加

竹瀝

伍分

理中湯

白朮錢貳炙草伍分乾姜壹錢水煎服或加人參更妙

逍遙散 紫蘇飲 六君子湯俱見前

子癰又名子氣 子滿 胎水

木通散 妊婦氣血失調營衛澁滯故令身體浮腫而小便不利此名子腫宜服此方

木通 蘇梗 茅朮炒 桑白皮各壹錢 枳殼炒 栝榔各伍分

條芩壹錢訶子皮叁分木香叁分

產科心法曰娠妊婦人常有面目腿足腫脹故有各腫之名其實皆由脾土不足以傳化水穀之濕而胞胎壅遏

膀胱不化水泛橫流致肺氣不降而喘息水便淋漓不利古方用鯉魚湯 葵茯湯 白朮散皆有妙處予每用五皮飲如水腫法治之亦多驗蓋一體水症也此方簡而易不愈再用鯉魚湯惟參朮不宜早補補則填塞不通總宜利濕爲先如輕而小便利者或體厚者亦可不治待生子後自消

葵茯湯

冬葵子半斤 茯苓參兩 共爲末米飲下三錢

白朮散

白朮土炒壹錢伍分 茯苓貳錢 澤瀉壹錢 陳皮捌分 姜皮肆分 大腹皮壹斤

錢伍肆分 木香肆分

加味五皮飲

桑白皮壹錢伍分 大腹皮壹錢伍分 此味只可治胎腫常見

茯苓皮壹錢伍分 新會皮壹錢伍分 紫蘇梗壹錢伍分 車前子壹錢伍分

老姜皮捌分 五加皮壹錢伍分 二三劑後再加白朮茯苓俟

消去大半再用六君子湯補其脾氣宜食淡淡以滲利也

子嗽又名子哈

宜胎飲 治懷孕四五月咳嗽五心煩熱胎動不安或痰血或鼻衄皆因火旺上沖肺經謂之子嗽宜服此方六

七劑

生地

叁錢

歸身

麥冬

去心各壹錢伍分

白芍

酒炒貳錢

阿膠

杜仲

鹽水炒

續斷

鹽水炒

條芩

枳殼

麩炒各壹錢

加炒

熟砂

仁末

叁分

河水煎

產科心法曰：娠妊數月，胎熱冲肺，金常有咳嗽者，宜用瀉白散，加黃芩、蘇梗、川貝主之。如感風熱，再加荊芥、桔梗、甘草。母任咳嗽傷肺，致成產勞，又不可用溫散之味。如羌活、麻黃、桂枝之類，反傷肺而助火，恐胎熱上逼，莫可療也。如瀉白散加味服之，不愈可服六味地黃湯爲至穩之法。

瀉白散

桑白皮

貳錢

地骨皮

參錢

煎服

六味地黃湯

熟地

參錢

萸肉

壹錢

茯苓

壹錢

山藥

貳錢

澤瀉

捌分

麥冬

壹錢伍分

空心

煎服

子瘕

產科心法曰娠妊至八九月忽然不語謂之子瘕不必驚

慌但以飲食調養亦不必服藥此胞胎繫於腎腎脈貫

舌本待分娩自能言也如不放心可服四物湯

見前

加

茯神遠志亦有即能言者若妄投雜藥反恐有誤

子淋

與三十頁參看

冬葵子湯

懷孕而小便淋瀝此本於濕熱名曰子淋宜

服此湯

冬葵子

略炒

柴胡

伍分

桑白皮

炒

白茯苓

歸身

各壹錢伍

分白芍

壹錢酒炒

又方單用地膚子四兩水煎分三次服

產科心法曰腎開竅於二陰與膀胱爲表裏熱則小便淋

瀉甚者心煩悶亂用子淋散主之如腎虛熱不能司化

用六味湯

見前子嗽

加車前子又安樂散葵子散皆可選用

子淋散

茯苓貳錢 麥冬壹錢伍分 木通壹錢 甘草叁分 大腹皮貳錢 淡竹葉壹錢
水煎服

安樂散

人參肆分 麥冬壹錢伍分 歸身壹錢伍分 甘草叁分 通草捌分 滑石壹錢
細辛叁分 燈心伍分 水煎服 如用党參壹錢伍分

葵子散

冬葵子壹錢 滑石壹錢 木通捌分 加蔥白七寸水煎服

轉胞

三合湯探吐法 孕婦中氣怯弱不能舉胎胎壓其胞以致小便不通名曰轉胞用二陳四物四君子三方合煎

服而探吐之以升提其氣上竅通而下竅自利也

人參

壹錢 白朮

土炒 白芍

酒炒 各壹錢 伍分

茯苓

生地

當歸

各貳錢

錢川芎

捌分 半夏

壹錢 陳皮

壹錢 甘草

伍分

產科心法曰此症不比淋淋乃頻數不通轉胞則點點滴

滴甚至點滴不能下症重於子淋矣此胎墜於下胞系

被壓故名轉胞其禍最速如不急治卽濁汚上逆上吐

清水如關格可不危乎朱丹溪先生用補中益氣湯隨

探吐之大有義理吾師鍾齡先生用茯苓升麻湯每效

如神古方有用四物湯加黃芩澤瀉此治輕者而用也

又張仲景先生治轉胞方用熱八味湯乃下焦偶感虛

寒胎氣陰冷寒水斷流得煖則陽氣宣通也又有一症
爲孤陽無陰不能化氣者宜補其陰古方滋腎丸是也
間常用六味湯加車前牛膝亦多收功斯二症一陰一
陽水火之分極宜深究不可錯悞當診其脈之遲數察
其人之喜冷喜熱合而辨之庶不悞人

補中益氣湯

見前胎動不安

四物湯

見前胎漏

六味湯

即八味除桂附

茯苓升麻湯

白茯苓

赤茯苓

各伍錢

升麻

壹錢

當歸

貳錢

川芎

壹錢

苧根

大錢

急流水煎服

八味湯

即六味加桂附

熟地

叁錢

萸肉

壹錢

山藥

壹錢伍分

茯苓

貳錢

澤瀉

捌分

麥冬

壹錢

代丹皮

肉桂

叁分

製附子

叁分

此二味

胎中慎用

水煎

涼服

滋腎丸

黃柏

壹兩

知母

一兩

肉桂

壹錢

淨皮

研

蜜丸

開水

下五錢

臍燥

又名孕悲

清燥湯

治懷孕

六七十日

大便燥結

腹滿

努力難解

無

故悲泣謂之臍燥

宜服此湯

六七劑

瓜蒌仁

炒研

白芍

酒炒

歸身

各壹錢伍分

甘草

肆分

生地

去

麥冬

去

心

麻仁

炒各錢

枳殼

炒

條芩

各壹錢

加松子仁

三錢

河水煎

調

白蜜十匙服

產科心法曰孕婦無故悲泣爲臍燥也用大棗湯或竹茹

湯治之自愈

大棗湯

小麥參兩甘草參兩大黑棗拾枚水六碗煎三碗分三四次服

竹茹湯

人參 茯苓 各壹錢 半夏伍分 麥冬伍錢 甘草伍分 竹茹壹錢

加姜棗煎服此方心虛煩驚悸皆可治

又曰孕在腹中總有胎熱大便燥者多切勿臨園用力努

掙多有因此而小產者爲用力努傷胎氣致兒隨下亦

有掙傷胞衣而墜下者蓋胎被氣迫下氣愈迫大便愈

難出只宜服生地四物湯見前加松子黑芝麻或麥冬
瓜萸並以菜油或生麻油冲湯飲之皆潤腸之意如大
黃滑利之藥斷不可服

尿血

又曰孕婦血尿不必驚慌方用續斷湯或膠地湯如怒動
肝火用加味逍遙散見前若食火炙熱物用加味清胃
散見後有血熱流滲於脬卽爲血淋用葵子一升研細
水煮分三次服

續斷湯

川續斷

赤芍

當歸

各伍錢

生地

壹兩

共爲末每空心蒸

白煎湯調服二錢

膠地丸

阿膠

蛤粉炒研末

大生地

酒蒸熟杵膏各貳兩

二味爲丸如桐子大每

服七十丸空心米飲下此方極穩且補血如急時每樣

二錢水煎服

乳泣

有孕在腹乳自出名曰乳泣出多恐生子難養緣內血不

足以養胎也乃氣血虛弱不能統攝宜多服八珍湯

見前

漏胎以助其血

胎不長

婦人月經不行已六七箇月從前月事準今又無病腹不見大脈見微滑但不甚旺此胎不長也是以常有十二三箇月而生者此產母血氣不旺法當助其血氣補其脾胃卽胎長腹大矣補脾用五味異功散培血用八珍湯如有別疾隨症加減 指掌方用黃芪湯白朮丸皆能長胎均助脾胃補衛任之法

五味異功散

卽六君子除半夏

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

加姜棗煎服

此方

除陳皮加四物湯卽八珍湯

黃芪湯

黃芪

壹錢

白朮

壹錢五分

茯苓

貳錢

麥冬

壹錢

人參

伍分

陳皮

捌分

甘草

叁分

姜棗煎服

如無力用參

以黨參

壹錢

代

伍分

白朮丸

白朮

壹錢

當歸

壹錢

阿膠

壹錢

熟地

叁錢

川芎

捌分

牡礪

伍錢

川椒

柒粒

蜜丸

熱病防損胎

孕婦或感傷寒或染時令火症燒熱昏昏不退急用涼藥

清解以保其胎如三黃解毒芩連羚羊之類惟犀角傷

胎之物不宜用如不解至胎損腹中不得下孕婦昏憤

斯時極難措手須驗產母之舌如面赤舌青其子已損

急用平胃散加朴硝服下立出但死胎不得不下下之
又恐氣隨下脫不下又難保產母倘面青舌赤及面舌
俱青而口吐白沫者皆兩命難存不可爲也設遇胎下
面轉赤色尙有一息之機隨卽以參芪歸地救之間可
十活一二 若用加味芎歸敗龜板湯亦可下死胎則
平穩較勝

平胃散

蒼朮

錢貳

厚樸

錢壹

陳皮

錢壹

甘草

捌分

加朴硝

叁錢

煎服

又

方獨用朴硝三四錢童便一鍾和熱酒調服卽下但下
後卽如產後溫補若仍作熱症醫卽錯矣

娠妊傷寒

凡遇傷寒必保胎莫與尋常一樣猜最穩只宜香蘇飲分
經加味變通來

香蘇飲

香附

錢貳

紫蘇

錢壹

陳皮

錢壹

甘草

肆分

砂仁

伍分

如太陽經加防

風

錢壹

荆芥

錢壹

秦艽

錢壹

陽明經加葛根

捌分

知母

錢壹

少陽經

加柴胡

叁分

黃芩

錢壹

人參

叁分或潞

黨

錢壹

瘧疾

卽是少陽症邪在半表半裏之間

此症乍寒乍熱過時神清有一日一發有間日一發者始
則亦宜香蘇飲表之如待寒熱分明始用以柴胡湯和

解之切勿早用柴胡若汗多宜加人參如熱盛寒少而有汗可加石膏知母以涼散退熱勿使熱傷胎氣當早爲畱意

泄瀉

感寒熱者水瀉食生冷而不化者溏瀉皆神朮散治之

神朮散

製蒼朮

壹錢伍分

厚朴

捌分炒

陳皮

捌分

甘草

伍分

砂仁

伍分

藿香

壹錢

加姜一片煎服

或加茯苓大腹皮

痢疾

瀉輕而痢重痢則裏急後重下痢紅白稠粘臭穢此積物

與熱結聚腹胃氣閉不通宿滯不去不愈初宜葛芍湯
後用香連丸總以能食爲輕食減爲重絕食噤口者死

葛芍湯

葛根

壹錢

赤芍

叁錢

廣皮

壹錢伍分

苦參

壹錢

陳茶葉

貳錢

煎服不已

再加山查

叁錢炒

神麴

壹錢炒

或枳榔

伍分

香連丸

廣木香

壹兩焙

川連

伍錢焙

神麴糊爲丸

每服二錢

米飲下

止後隨服生地四物湯

見前漏胎

以調血分

鬼胎

人之臟腑安和心思靜正精神健旺氣血充實安得有妖

魅之邪惟體本柔弱精神惑亂或獨居靜室而多驚疑則邪氣交侵而受或夢與鬼交而成經閉腹大正如懷子一般但其婦必面色青黃不澤脈細澹或大或小兩手兩樣變更無定或作寒熱之狀攢眉不樂之形此由肝脾憤鬱之氣非胎也治用雄黃丸攻之而以各經見症之藥輔助元氣前賢又有斬鬼丹亦極妙消去隨服桂附八味或六君子湯歸脾湯以補正心脾自無他患虞氏曰此肝腎相火發爲白淫流入子宮結爲此胎是本婦之精結成非真有鬼交也

雄黃丸

明雄黃

鬼臼

丹砂

水飛各伍錢

延胡索

朱錢

麝香

壹錢半夏

壹兩 姜炒 川芎

朱錢

其爲末蜜丸空心服三十丸

斬鬼丹

此方不用爲安必不得已用之丸須如梧桐子

不可稍大

吳茱萸

壹錢

川芎

叁錢

秦艽

肆錢

柴胡

壹錢

芫花

貳錢

僵蠶

貳錢

巴豆霜

捌分

巴戟天

壹錢

蜜丸

酒服七丸下惡物愈

桂附八味丸

見前小

便不通

六君子湯

見前乳泣異功散加半夏

歸脾湯

見前漏胎

吐血

孕婦吐血或因感風熱者必先咳嗽嗽久見血用香蘇飲

加黃芩象貝以清散風去咳止血必不吐也或胎熱胃

火上冲而吐者但用安胎飲加黃芩麥冬其生地須用
小者胎涼血自歸原或因食煎炒炙燂之物致胃火上
逆而吐血者用清胃散去丹皮加麥冬黃芩主之若本
體虛弱素有血症者用六味地黃湯加地骨皮欬石斛
麥冬牛膝降其虛火自安

安胎飲見前胎動六味地黃湯見前子喻

香蘇飲

蘇葉壹錢香附捌分陳皮柒分甘草伍分荆芥捌分蔓荊子壹錢川芎叁分秦艽壹錢防風伍分水煎服

清胃散加減

生地

叁錢

連翹

壹錢貳分

川連

叁分

麥冬

貳錢

黃芩

伍分

象貝

壹錢

煎服

便血

孕婦大便見血亦是血熱妄行大凡血症上行爲逆下行

爲順宜服生地四物湯

見前漏胎

加麥冬

壹錢伍分

槐米

壹錢伍分

赤

芍藥甘草

貳分

主之如係臟毒加金銀花貳錢必自愈

孤漿

孕婦六七箇月暴下黃汁水或如膠或如豆汁多至升許

名曰孤漿並非產也然每每胎動腹痛皆氣血元虛若

認爲產心慌神張則胎必墮急服黃芪糯米湯可保胎

服人參更妙方用黃芪六兩糯米半升水七升煮汁三

升分作四服日三夜一儘服完爲妙

悞服傷胎之藥

薛立齋曰妊婦悞服毒藥胎動不安急服甘草黑豆淡竹葉濃煎以解之予謂毒藥者卽內經婦人身重毒之如何此必有他病而用胎中所忌之藥以致胎動非真有信砒毒也

心痛

大全曰娠妊心痛乃風邪痰飲交結子謂肝氣不暢者多若傷於絡則乍作乍安名曰厥痛若胎動下血乃傷觸子臟也用安胎飲或火龍散手拈散輕者一味砂仁湯

使氣調自安若果真心痛指甲青朝發暮死夕發旦死
無能爲力然此症懷孕者少蓋真心痛爲寒冷入心水
尅心火滅也而懷妊者必有胎熱當之不致寒水凌心
火龍散

川棟子

茴香

各壹錢

艾葉

柴分鹽水炒

煎服

手拈散

延胡索

伍分

五靈脂

伍分

草果

陸分

乳香

去淨油

沒藥

去淨油各壹錢

共

爲末服一錢

胸腹痛

張仲景曰懷孕腹痛當歸芍藥散治之此益氣血也然或

有宿痰或風冷觸犯或氣或食總以香附砂仁蘇梗生
姜四味最穩

當歸芍藥散

當歸

壹錢伍分

白芍

壹錢

茯苓

貳錢

白朮

土炒壹錢伍分

澤瀉

壹錢伍分

川芎

陸分 水煎服或爲末每服二錢

腰痛

大凡腰痛皆屬腎虛在妊中最宜急治蓋胞胎繫於帶脈
帶脫則胞下墜矣古方用青娥散治之予常以熟地杜
仲合保胎丸多效

青娥丸

自尿血至此
出產科心法

杜仲

肆兩 姜炒

補骨脂

壹兩 鹽炒

核桃肉

貳兩

爲末蜜丸酒下三錢

子淋固真飲

治懷孕三四月內熱體倦腰腿酸痛白帶

淋漓小便頻數飲食少思謂之子淋宜服此方

白朮

土炒

條芩

續斷

鹽水炒

白蓮鬚

芡實

廣皮

各壹錢

杜仲

鹽水炒

山藥

各壹錢 伍分

麥冬

去心 貳錢

加建蓮五粒不去心

打碎天泉水煎服

安胎丸 治懷孕三月惡心懶倦已退臟燥已潤於四五

六七八月逐月服此丸料善能和中保胎養血調氣健

脾進食功效無比

生地

肆兩 兩水酒煮爛蒸

歸身

酒炒

白芍

酒炒

於朮

米泔浸切 片飯上蒸

曬伍次土拌陳皮條芩酒炒川斷鹽水炒杜仲鹽水炒麥

冬去心各共搗曬乾磨末煉蜜爲丸每朝砂仁湯送下

三四錢如脾虛多瀉加山藥兔絲餅各三兩如元

氣大虛加人參二兩○如血虛加阿膠二兩

繡閣保生書保產方

懷孕一月不須服藥如有不安卽當調治宜服安胎飲

白朮貳錢炒條芩壹錢伍分微炒水一鍾煎服如血不足加歸身

一錢五分

大安胎飲

當歸貳錢人參伍分炙甘草各伍分荆芥穗各伍分砂仁炒不桑寄

生 白朮炒 白芍酒炒 條芩炒 續斷鹽水炒 川芎煨切 熟地酒洗

各壹錢 水煎服如覺氣不順而喘加蘇梗一錢

懷妊二月胎氣始盛逆動胃氣惡阻嘔吐飲食少進用陳

皮大半夏湯

陳皮去白鹽水拌曬 茯苓各壹錢 子芩淡姜汁炒 枳殼炒 紫蘇各捌分 炙

草伍分 製半夏貳錢伍分 姜一片水一鍾煎七分食遠服

懷妊三月惡阻不止飲食少進前方為主煎湯下抑青丸

川黃連姜汁炒叁次 研末米糊爲丸如菉豆大每服七分

懷妊四月如覺倦臥不安或口苦頭痛腳弱及腫急服安

胎和氣飲

歸身

酒洗

白朮

土炒

各壹

白芍

壹錢

茯苓

香附

鹽水炒

各捌分

陳皮

去白

黃芩

炒

水煎服如

陳皮

去白

黃芩

炒

炙甘草

川芎

各伍

水煎服如

熱多加山梔一錢

懷妊五月覺胎長腹重睡臥不安服養胎飲

白朮

壹錢伍

白芍

酒炒

歸身

酒洗

澤瀉

壹錢

川芎

捌分

黃芩

分

枳殼

炒

炙甘草

水煎服

分

枳殼

炒

炙甘草

水煎服

懷妊六月或腹痛或脹悶或胎動不安服大安胎如勝飲

當歸

貳錢

白朮

壹錢

茯苓

壹錢

子芩

壹錢

白芍

酒炒

砂仁

去衣

炒

桑寄生

各壹

甘草

伍分

水煎服

分

桑寄生

各壹

甘草

伍分

懷妊七月覺胎氣不安或損傷漏血或腹大重墜急服清

當歸

貳錢

白朮

壹錢

茯苓

壹錢

子芩

壹錢

白芍

酒炒

砂仁

去衣

炒

桑寄生

各壹

甘草

伍分

水煎服

分

桑寄生

各壹

甘草

伍分

水煎服

懷妊七月覺胎氣不安或損傷漏血或腹大重墜急服清

當歸

貳錢

白朮

壹錢

茯苓

壹錢

子芩

壹錢

白芍

酒炒

砂仁

去衣

炒

桑寄生

各壹

甘草

伍分

水煎服

分

桑寄生

各壹

甘草

伍分

懷妊七月覺胎氣不安或損傷漏血或腹大重墜急服清

當歸

貳錢

白朮

壹錢

茯苓

壹錢

子芩

壹錢

白芍

酒炒

砂仁

去衣

炒

桑寄生

各壹

甘草

伍分

水煎服

分

桑寄生

各壹

甘草

伍分

胎萬全飲

當歸

白朮

炒續斷

各壹錢伍分酒洗

子芩

酒炒

白芍

酒炒

桑寄

生

熟地

阿膠

蛤粉炒各壹錢

茯苓

荆芥

各捌分

甘草

伍分水

煎服

懷妊八月覺胎氣不安氣逆氣喘宜服束胎調氣飲

陳皮

枳殼

麩炒蘇梗

茯苓

白朮

炒各壹錢

子芩

壹錢伍分

甘

草

叁分

水煎服

懷妊九月雖無他症亦宜順氣和中扶脾安胃使無難產

之患宜服順胎和氣飲

當歸

貳錢白朮

壹錢五分炒

大腹皮

捌分

豆汁浸

水洗肆次淨

水煎服

懷妊十月宜服滑胎飲二三日一服

當歸 白朮炒 陳皮 香附各壹錢 伍分 白芍貳錢 酒炒 川芎陸分

黃芩炒 蘇梗各伍分 甘草叁分 水煎服如氣虛加人參一錢

胎肥加枳殼一錢炒

豬脂方

人參壹錢 蓮肉壹兩 去心 白藕豆貳兩 去皮 用雄豬脂一箇洗淨將

參等裝入用線紮口將大砂鍋一箇用碎碗片鋪底以

防著底鍋裂扣水漫火燉熟孕婦七八箇月每月吃二

三箇連湯藥吃完大補脾胃精神健旺可免崩暈諸症

醫方考胎前要法

黃芩白朮考白朮益脾能培萬物之母黃芩瀉火能滋子
戶之陰故曰安胎聖藥

砂仁慈湯 妊娠腹痛此方主之

砂仁去衣壹錢炒研連翹慈白根叁煎湯服腹痛者氣血澁滯不

通之故用砂仁順氣於下慈白順氣於中氣行血和其
痛自止倘別有他故而痛者宜隨症治之

東胎飲 凡難產者或因肥甘凝滯以致兒身肥大或因

胎中有火熱盛而胎液乾澁娠妊七八月服此則胎氣

斂束令人易產

白朮貳兩茯苓朱錢伍分陳皮壹兩黃芩壹兩水煎分五服

達生散 娠妊臨月服之易產達小羊也羊子易生故名

達生

大腹皮

叁錢豆汁浸水洗肆次淨曬乾

人參

壹錢

陳皮

壹錢

紫蘇

壹錢

歸身

壹錢

白芍

酒炒壹錢

白朮

炒壹錢

炙甘草

伍分

薤根

壹錢

黃楊樹頭

柒枚

春加川芎

夏加黃芩

秋冬加砂仁

枳殼

安胃定胎散

白朮

壹錢

陳皮

柒分

砂仁

伍分

茯苓

壹錢

歸身

捌分

藿香

叁分

加老姜

一片炒米二錢水煎服如惡心而吐痰者加製半夏五

分

保產無憂散

俗名十一味方

此方懷妊後每月服一二劑臨月再

服二三劑若月分雖足腹中似痛總宜服此方庶易產
并可免產後餘患若未及時而痛者服之即安真仙方
也若兒已離母下咽即死斷斷不可悞服慎之慎之

黃芪

蜜炙捌分

當歸

壹錢伍分

川芎

捌分

白芍

壹錢酒炒夏

炙甘

草

伍分

羌活

伍分

厚朴

姜汁炒柒分

枳殼

陸分

斷艾

伍分

荆芥穗

捌分

兔絲子

壹錢伍分

川貝

壹錢

加老姜一片水煎服產科心法加

大腹皮五分

催生諸藥說

生不必催也催之非但無益而反害之矣古方有用兔腦
丸者有用猪脂者有用油蜜葱白者有用冬葵子者有

牛乳榆皮滑石者有用金鳳子者有用弩牙灰者有用
石榴枝者有用筆頭灰者有用百草霜者有用伏龍肝
者有用鑿頭灰者有用握石燕者有用蓖麻子貼於足
心者用之不驗徒增煩擾噫平時失於調理不守禁忌
以致臨產艱難頻以雜藥催之又何濟乎

痰鼓似胎案

產科心法曰昔於庚辰歲海甯萬家渡金姓娶妻十載未
孕忽月事過期長安醫者謂之孕遂以熟地阿膠苓朮
之類補之延至十月尙不見產腹日大婦日病及至十
五月人不起牀食不下喉腹大異常偶一腹痛卽腹鳴

如踏水車之聲門外俱聞其嚮危急之甚延予診治其
人已淹淹一息諸醫袖手待斃有曰鬼胎有曰經阻予
診之六脉滑大無倫按之堅實乃曰非孕也此痰鼓也
由思多傷脾脾不爲胃行其津液而化痰初悞爲孕服
滋膩寒涼之藥致痰不行積久而成斯症若不攻之必
無生理隨用二陳湯加南星厚朴枳櫚三稜莪朮桂姜
二三劑卽下行病家恐致痢急請復視脈稍和所下者
赭色成塊挑開內白色予曰此血裏痰也卽於前方加
大黃礞石又數劑日下二三十行腹漸消而進糜粥矣
十日後轉用姜桂六君子湯枳實理中丸煎丸並進而

病人起矣彼時若再姑息不攻安得不脹死所以藥貴得當何妨破格用之以起沉痾因存是案以備後人之用又嘗讀吳菱山先生辨疑書中治一婦痰飲血癥症爲前醫悞認爲胎與此症相似

瘦胎不可服辨

前錄諸方用香附枳殼者十有七八而予家家傳胎產各方著有此辨極

言二藥之害故其胎前十八方皆屏除二味專補胎元兼顧他症茲并錄之以俟擇用雅卿識

時人用香附枳殼等耗氣藥立斂胎易產方非無見也蓋倣古方士進湖陽公主枳殼瘦胎方後遂擴增幾味耗氣藥品巧立斂胎易產名目使人秘而信之惑世害人甚矣彼方士因湖陽公主居養厚而形樂食膏粱而胎

肥過期難產特進此方亦俸中耳其胎之損元不壽不
責咎也常人豈可概服乎夫孕至九十兩箇月胎形全
具一母之氣分蔭其胎業已兩用正宜大補母弱兼培
他症反消耗之則母已不暇救安望有餘血分蔭其胎
是以虧損胎元日漸瘦弱未見斂胎易產之效反滋虧
元損壽之患可不慎乎其孕母氣血虧損多至臨盆難
產婉後暈厥危症亦由所致人自不知耳卽婦人良方
所載無憂散保氣散神寢丸俱不可服

滋榮易產方

保產

孕婦九十兩月服之有益

川芎

壹錢

當歸

叁錢

人參

壹錢弱人
貳叁錢

茯苓

捌分

甘草

肆分

陳皮

肆分

黃芩

錢貳

大腹皮

懷生地

益母草

白朮

各貳錢

凡孕婦謹守禁忌可保安正產若悞服降性藥多則胎墮小腹悞食莧菜則胎欲產稟弱人孕至五六月亦腰疼欲墮三者並服補母壽子方以安之方見墮胎後惡阻前胎傷藥食墮下者少加升麻伍分以提之腰疼欲墮者一時頻服兩帖方安弱母成孕後食減困倦足腿腫者日服一帖以安之又必謹戒房勞

胎前十八方

一孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食無味孕至五六月並宜服 加減丹溪安胎飲

開胃安胎

白朮 當歸 各貳錢 川芎 條芩 各捌分 人參 壹錢 熟地 貳錢

陳皮 紫蘇 各肆分 砂仁 叁分 姜棗水煎

二孕婦元氣不足倦怠或胎動不安或身微熱減食並宜

服之如腰疼腿痛必一日一夜兩帖方安 加味安胎

飲 增元補腎

人參 貳叁錢 當歸 貳錢 白朮 叁錢伍分 條芩 捌分 陳皮 紫蘇 各肆分

熟地 貳錢 砂仁 甘草 各叁分 煩渴加麥冬 壹錢 姜棗水煎

三孕成三箇月內惡阻嘔逆惡食或頭暈倦怠宜服 加

味參橘飲 定嘔安胎

人參 竹茹 各壹錢 白朮 當歸 各貳錢 半夏 捌分 橘紅 藿

香 甘草 各肆分 砂仁 叁分 肥人加竹瀝半盞姜汁半匙水

煎服

四孕婦常多怒氣胸腹滿悶或多服烏藥香附砂仁等耗

氣藥反加滿悶可服 加減順氣安胎飲 平怒寬胸

人參 白朮 各貳錢 當歸 各貳錢 川芎 各捌分 條芩 各捌分 陳皮 肆分 甘

草 木香 磨冲各貳分

加味安胎飲 定痛祛寒

人參 壹錢伍分 白朮 當歸 熟地 各貳錢 川芎 捌分 甘草 紫

蘇 陳皮 各肆分 姜水煎兼寒加吳茱萸 壹錢 或乾姜 砂

仁 各伍分

五孕婦面目虛浮四肢有水氣多因脾胃氣虛或久瀉所

致可服加減全生白朮散

健脾利水

白朮

當歸

各貳錢

人參

茯苓

各壹錢

川芎

各捌分

甘草

叁分

紫

蘇

肆分

陳皮

大腹皮

各柒分

水煎服

六孕婦胎氣上攻心腹脹滿作痛可服加減順氣安胎

飲

消脹

人參

壹錢

白朮

當歸

各貳錢

紫蘇

甘草

陳皮

砂仁

各肆分

川芎

條芩

各捌分

姜水煎

七孕婦下血不止或按月去血點滴名曰漏胎大率多因勞力或因氣血虛損或因喜食炙博物多宜戒房事可

服加減 補中安胎飲 止血

白朮 當歸 熟地 條芩 各貳錢 人參 壹錢 甘草 肆分 紫蘇

白芷 各伍分 姜水煎

八孕婦頓仆動胎下血不止宜先服補中安胎飲 見上一日

兩帖不止可服此方加減 膠艾無憂散 止血安胎

人參 伍錢 當歸 熟地 白朮 各貳錢 川芎 條芩 各捌分 甘

草 陳皮 紫蘇 各肆分 阿膠 壹錢 艾葉 捌分 姜水煎如感寒

頭痛加連翹葱白二箇腹痛去艾葉加帶皮砂仁四分

九孕婦心驚胆怯煩悶不安名曰子煩可服加減 竹葉

安胎飲 定驚祛煩

人參

棗仁

麥冬

各壹錢

白朮

當歸

各貳錢

甘草

肆分川

芎

朱分

陳皮

叁分

黃芩

遠志

各捌分

竹葉

拾片

生地

壹錢伍分

姜棗

水煎

煩渴

加竹茹

壹錢

有痰

加竹瀝

半盞

姜汁

半匙

脾胃

瀉去棗仁地黃

十孕婦腿膝發腫氣促滿悶不舒或指腫水出蓋脾主四

肢脾氣虛弱不能製水而發腫肺腎少氣而氣促滿悶

名曰子氣宜服補中健脾湯虛人服天仙散必加人參

歸朮方可用天仙藤散

消腫治水

天仙藤

卽青木香洗略炒

香附

各陸分

陳皮

紫蘇

各肆分

甘草

叁分

烏藥

柒分

木瓜

壹錢

姜皮

叁分

水煎

虛人

加人參

壹錢

白朮

貳錢當

歸錢貳如脾胃虛弱兼服補中益氣湯見前胎動不安

十一孕婦口噤項強手足攣縮言語蹇澁痰涎壅盛不省

人事不可作中風治宜用羚羊角散如無痰言語如常

但見似中風症多因血燥類風切不可一概作中風治

誤人事也可服加味羚羊角散開噤消痰

羚羊角錢壹川獨活捌分棗仁炒壹錢五加皮捌分苡仁捌分防風

伍分川芎柒分當歸貳錢茯神捌分杏仁去皮尖十粒木香貳分甘草肆分

姜水煎虛加人參壹錢痰加竹瀝半盞姜汁半匙脾胃弱

加白朮貳錢伍分

十二孕婦小便澀少或成淋瀝名曰子淋可服加味安

榮飲

通便止淋

人參

白朮

當歸

麥冬

各貳錢

茯苓皮

通草

甘

草

各壹錢

燈心

伍分

若有痰侵肺金加黃芩

柒分

十三孕婦咳嗽屬風屬寒可服甯肺散

止咳寒

天冬

知母

各壹錢

桔梗

紫蘇

甘草

各伍分

寒嗽加杏

仁桑皮

捌分

廣橘紅

肆分

竹瀝姜汁熱嗽加黃芩

捌分

加紫苑

壹錢

欵冬

陸分

夜喘嗽加麻黃

肆分

虛損嗽加瓜蒌

壹錢

竹瀝姜汁心胃不舒加貝母

壹錢

百合

壹錢

又方嗽不止胎不安

杏仁

貳錢

甘草

肆分

紫苑

壹錢

桑皮

壹錢伍分

桔梗

捌分

天冬

壹錢伍分

水

煎服

十四孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛宜服六和湯止吐祛煩

陳皮 藿香 甘草各肆分 半夏柒分 杏仁拾粒 竹茹 木瓜

各壹錢 扁豆貳錢 砂仁伍分 人參壹錢 茯苓捌分 姜棗水煎 次服

丹溪安胎飲見前

十五孕婦熱病嘔吐不食胸中煩燥宜服蘆根散止嘔卻燥

葛根 蘆根 人參 麥冬 知母 梔子 竹茹各壹錢

葱白叁寸

十六孕婦熱病癰出赤黑色小便如血氣欲絕胎欲落宜

服青胎飲退熱回生

梔子

黃芩

升麻

各壹錢

青黛

捌分

豆豉

肆拾玖粒

生地

貳錢

杏

仁

拾粒

石膏

壹錢伍分

葱白

柒寸

十七孕婦熱痛骨節疼不急治卽落胎

葛根

捌分

石膏

貳錢

前胡

捌分

青黛

水飛淨壹錢伍分

有痰加竹瀝一

酒薑姜汁半匙

十八孕婦患吐衄血或因破傷失血驀然口噤項強背直

類中風症宜服安胎飲

人參

叁錢

當歸

白朮

熟地

天麻

各貳錢

麥冬

壹錢

陳皮

甘草

條芩

防風

荆芥

各肆分